

Proveca udvikler medicin og doseringsformer, der er egnede til børn.

Sialanar® er udviklet til behandling af alvorlig kronisk spytflåd hos børn med kroniske neurologiske lidelser:

Koncentreret opløsning (2mg/5ml glycopyrronium bromid) betyder at der skal synkes en relativ lille mængde



Den medfølgende doseringssprøjte forenkler titrering



Smagsmaskeringen med hindbær øger fornøjelsen ved at tage medicinen



Den åbnede flaske varer i 60 dage afhængigt af dosis



Ingen specielle krav til opbevaring. Efter åbning har flasken to måneders holdbarhed.



For yderligere information se: www.pro-medicin.dk

Anvendelsesområder.

Symptomatisk behandling af kraftig spytproduktion eller manglende synkning af spyt (sialorré) hos børn og unge ≥ 3 år med kroniske neurologiske forstyrrelser. Bør ordineres af læger med erfaring i behandling af børn og unge med neurologiske lidelser.

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 320 mikrogram glycopyrron (svarende til 400 mikrogram glycopyrroniumbromid).

Kontraindikationer

Kontraindicerede tilstande pga. den antikolinerge virkning

- Glaukom
- Urinretention
- Tidligere tarmobstruktion
- Colitis ulcerosa
- Paralytisk ileus
- Stenosis pylori
- Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

Væsentlige antikolinerge bivirkninger.

Omsorgspersonen bør stoppe behandlingen og kontakte lægen ved:

- Obstipation
- Urinretention
- Pneumoni
- Allergiske reaktioner
- Pyreksi
- Adfældsændringer
- Meget varmt vejr, hvor der er risiko for overophedning.

I disse tilfælde bør lægen revurdere behandlingen og evt. dosisjustering kan overvejes.

Bivirkningar

Meget almindelige ($> 10\%$) Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning. Ansigtssrødme, Nasal tilstopning, Nedsat bronkialsekretion. Irritabilitet. Urinretention. Almindelige (1-10%) Temperaturstigning. Epistaxis, Pneumoni. Agitation, Døsighed. Hududslæt. Infektion i øvre luftveje. Urinvejsinfektion. Ikke almindelige (0,1-1%) Dehydrering. Nystagmus. Ikke kendt Bradykardi (forbigående). Adfærdforstyrrelse, Angst, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær. Allergiske reaktioner, Angioødem. Pludselig vandladningstrang. Glaukom.

Interaktioner

- Glycopyrronium forlænger den gastrointestinale transitid og øger dermed risikoen for skader i den øvre del af mave-tarm kanalen ved behandling med oral kaliumchlorid i fast form. Samtidig behandling med oral kaliumchlorid i fast form er derfor kontraindiceret.
- Samtidig brug af andre antikolinergika øger risikoen for antikolinerge bivirkninger og skal undgås. Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan have antikolinerg virkning (fx sederende antihistaminer, TCA og visse antipsykotika).
- Opioider kan øge risikoen for bivirkninger som svær obstipation, paralytisk ileus og CNS-depression.
- Glycopyrronium kan potentielt øge risikoen for hypertermi ved behandling med topiramet.
- Den peristaltikfremmende virkning af domperidon og metoclopramid kan modvirkes af glycopyrronium.

Farmakokinetikt

- Biotilgængelighed ca. 3%. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden markant.
- Fordelingsvolumen 1,31-1,83 l/kg (børn).
- Plasmahalveringstid 2,5-4 timer.
- Udskilles overvejende uomdannet gennem nyre.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder

035-0919-SJA-MS



Sialanar®

320 mikrogram/ml glycopyrronium svarende til 400 mikrogram/ml glycopyrroniumbromid

Sialanar® er en oral opløsning af glycopyrroniumbromid **specielt udviklet til børn**



Sialanar® er **det eneste registrerede lægemiddel** med glycopyrronium til **behandling mod alvorlig kronisk spytflåd** hos børn med kroniske neurologiske lidelser.

Eksempler på hvor langt Sialanar® rækker:

