

DOSERINGSTABEL FOR SIALANAR FOR BØRN OG UNGE MED NORMAL NYREFUNKTION¹

- Doseringsskemaet er baseret på barnets vægt.
- Startdosis er den samme som dosisniveau 1.
- Dosisniveauet justeres hver syvende dag og øges efter tabellen nedenfor.
- Dosis titreres til effekt.
- Maximal individuel dosis er 6 ml Sialanar (1,9 mg glykopyrronium) svarende til 64µ/kg kropsvægt glykopyrronium.

Tre gange dagligt	Dosisniveau 1	Dosisniveau 2	Dosisniveau 3	Dosisniveau 4	Dosisniveau 5
	(= 12,8 µg/kg)*	(= 25,6 µg/kg)*	(= 38,4 µg/kg)*	(= 51,2 µg/kg)*	(= 64,0 µg/kg)*
Vikt (kg)	Sialanar (ml)				
13-17	0,6	1,2	1,8	2,4	3
18-22	0,8	1,6	2,4	3,2	4
23-27	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
28-32	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0**
33-37	1,4	2,8	4,2	5,6	6,0
38-42	1,6	3,2	4,8	6,0**	6,0
43-47	1,8	3,6	5,4	6,0	6,0
>48	2,0	4,0	6,0**	6,0	6,0

¹Ved let til moderat nedsat nyrefunktion (eGFR < 90 – ≥ 30 ml/min/1,73m²) bør dosis reduceres med 30 % (for yderligere information og doseringstabel se produktresuméet)/

* NB µg/kg glykopyrronium/

** Maximal individuel dosis i denne vægtkategori.

DOSERINGSTABEL FOR SIALANAR®

FOR BØRN OG UNGE MED LET TIL MODERAT NEDSAT NYREFUNKTION

- Doseringsskemaet er baseret på barnets vægt.
- Startdosis er den samme som dosisniveau 1.
- Dosisniveauet justeres hver syvende dag og øges efter tabellen nedenfor.
- Dosis titreres til effekt.
- Maximal individuel dosis er 6 ml Sialanar® (1,9 mg glykopyrronium) svarende til 64µ/kg kropsvægt glykopyrronium.

Tre gange dagligt	Dosisniveau 1	Dosisniveau 2	Dosisniveau 3	Dosisniveau 4	Dosisniveau 5
	(≈ 8,8 µg/kg)*	(≈ 17,6 µg/kg)*	(≈ 27,2 µg/kg)*	(≈ 36 µg/kg)*	(≈ 44,8 µg/kg)*
Vægt (Kg)	Sialanar® (ml)				
13-17	0,4	0,8	1,2	1,7	2,1
18-22	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8
23-27	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5
28-32	0,8	1,7	2,5	3,4	4,2 **
33-37	1	2	2,9	3,9	4,2
38-42	1,1	2,2	3,4	4,2**	4,2
43-47	1,2	2,5	3,8	4,2	4,2
>48	2	2,8	4,2	4,2	4,2

* NB µg/kg glykopyrronium/

** Maximal individuel dosis i denne vægtkategori